



Профилактика синдрома врожденной краснухи



Краснуха — вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание крайне **опасно для беременных женщин**: при инфицировании возможно развитие синдрома врожденной краснухи (СВК) у плода.

Синдром врожденной краснухи (СВК) — это совокупность тяжелых пороков развития у новорожденного.

К наиболее частым проявлениям СВК относятся:

- катаракта, глаукома, микрофтальмия;
- врожденные пороки сердца;
- нарушения слуха (нейросенсорная тугоухость);
- задержка умственного и физического развития.

Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация!

- Вакцина против краснухи входит в Национальный календарь профилактических прививок в РФ (далее – Календарь) и проводится в возрасте 12 месяцев и повторно — в 6 лет.
- Согласно Календарю, все женщины до 25 лет подлежат обязательной вакцинации против краснухи при отсутствии иммунитета.
- Женщинам детородного возраста, не имеющим сведений о перенесённой краснухе или прививках, рекомендуется серологическое **обследование на антитела** к вирусу краснухи.

- При отсутствии иммунитета к вирусу краснухи рекомендуется проведение вакцинации **не позднее, чем за 2 месяца до планируемой беременности!**

Обратитесь к врачу, чтобы узнать свой иммунный статус и защитить себя и своего будущего ребенка!

